

“โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือ โรคไข้ซิกา”

เขียนโดย สำนักปลัด

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2023 เวลา 10:19 น.



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภัยเงียบจาก ยุงลาย

“โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือ โรคไข้ซิกา” เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา
อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (Flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ไวรัสไข้เลือดออก, ไข้ฉี่หนู, ไข้สมองอักเสบ
และไวรัสอีโบลา ซึ่ง มีอาการเจ็บป่วยต่างกันไป โรคนี้มักไม่รุนแรง
ผู้ป่วยมักหายได้เอง อาการจะไม่รุนแรง อวัยวะภายในปกติไม่มี

อาการ

- ไข้
- ปวดศีรษะ
- ตาแดง
- มีผื่นแดง
- ปวดข้อ
- ปวดกล้ามเนื้อ

หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะหายภายในเวลา 2 - 7 วัน

ปกติ

การติดเชื้อในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะ
ศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

การป้องกัน

ส่วนใหญ่อันตรายไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...

1. งดเดินทาง
ให้เจียนอง

2. งดไปมาก ๆ

3. หากมีไข้ให้รีบมาพบแพทย์
* ห้ามกินแอสไพริน *

การป้องกัน

1. เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง

2. เก็บขยะ สัตว์แยกขยะ
และทิ้งให้เรียบร้อย

3. เก็บน้ำ อิมปากทางให้สะอาด
ช่องทิ้งทิ้ง เจมิไม่ให้ยุงลาย
วางไปและอย่าอยู่ในบ้าน

ภาพจาก: กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมสุขภาพ
กรมสาธารณสุข กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1 / 1